

الفصل الحادي عشر

الصحة

الصحة

أظهرت نتائج المسح أن 8.6% من مجمل الفلسطينيين في إسرائيل يعانون من أمراض مزمنة، بواقع 9.1% بين الإناث مقابل 8.1% بين الذكور، وبواقع 9.0% في منطقة الشمال، 10.1% في منطقة الوسط مقابل 5.0% في منطقة الجنوب. وتجدر الإشارة إلى أن أعلى نسبة إصابة بأمراض مزمنة تظهر في المدن المختلطة (12.7%).

أشارت المعطيات إلى أن 3.4% من السكان الفلسطينيين في إسرائيل أفادوا بأنهم يعانون من مرض السكري. وارتفعت نسبة مرضى السكري بين الإناث مقارنة بالذكور حيث أفادت 3.8% من الإناث بإصابتهم بالمرض مقابل 3.0% من الذكور، أما من حيث التقسيم الجغرافي ففي منطقة الوسط أفاد 4.4% من السكان بأنهم مصابون بالسكري مقارنة بـ 3.6% في منطقة الشمال، و1.5% في منطقة الجنوب. وتجدر الإشارة إلى الارتفاع المطرد من جيل 30 فصاعداً في كلا الجنسين للمصابين بالسكري.

كذلك أفاد 3.4% من السكان بأنهم يعانون من ضغط الدم المرتفع، حيث بلغت هذه النسبة 3.7% في منطقة الشمال مقارنة بـ 3.5% في منطقة الوسط و 1.4% في منطقة الجنوب. وارتفعت نسبة الإصابة بضغط الدم بين الإناث حيث وصلت إلى 4.0% مقارنة بـ 2.7% بين الذكور. هذه الفجوة في نسبة الإصابة بين الذكور والإناث تظهر بشكل بارز في المجموعة العمرية من جيل 50 عاماً فما فوق.

أفاد 1.6% من السكان بأنهم يعانون من أمراض القلب، وارتفعت هذه النسبة بين الذكور مقارنة بالإناث في جميع المناطق. حيث وصلت إلى 1.9% بين الذكور مقابل 1.3% بين الإناث، أما النسبة الأقل لمرضى القلب فهي بين الإناث في منطقة الجنوب حيث بلغت 0.8%. وقد أظهرت النتائج أن نسبة الإصابة بأمراض القلب من جيل 35 حتى 64 بين الرجال تضاعف نسبتها بين النساء.

أفاد 0.2% من السكان الفلسطينيين في إسرائيل بأنهم يعانون من أحد أنواع السرطان، وتزيد هذه النسبة بين الإناث مقارنة بالذكور حيث وصلت بشكل عام إلى 0.2% بين الإناث وإلى 0.1% بين الذكور. والملفت للانتباه الارتفاع الحاد بالإصابة بالسرطان بين النساء من جيل 45-49. أما نسبة الإصابة الأعلى فظهرت في الفئة العمرية 55-59 إذ بلغت 4.0% بين النساء. وقد تضاعفت نسبة الإصابة بالسرطان في منطقة الوسط مقارنة بمنطقتي الشمال والجنوب.

أما السكان الفلسطينيون الذين أفادوا بأنهم يعانون من الإصابة بالقرحة (جرح المعدة) فقد بلغت نسبتهم 0.6%. وظهرت النسبة منخفضة جداً في منطقة الجنوب (0.1%) مقارنة بالمناطق الأخرى.

أفاد 1.3% من السكان الفلسطينيين بأنهم يعانون من مرض الربو، ارتفعت هذه النسبة في منطقة الوسط حيث أفاد

2.1% من السكان أنهم يعانون من هذا المرض مقارنة بـ 1.1% في الشمال و1.4% في الجنوب.

أظهرت نتائج المسح أن ما يعادل 2.9% من الفلسطينيين في إسرائيل معاقون، ويظهر ارتفاع بارز في نسبة المعاقين في الفئة العمرية 50-59 عاماً حيث قفزت إلى نسبة 8.6%. كما أظهرت المعطيات أن 40.6% من الإعاقات التي تمت الإفادة عنها هي إعاقات حركية وهذه النسبة تساوي 1.2% من مجمل السكان الفلسطينيين. بينما تشكل الإعاقات السمعية 13.2% والبصرية 13.1%.

وتبين المعطيات أن 30.8% من الإعاقات هي بمثابة إعاقات خلقية (مولودة). حيث أن 67.6% من الإعاقات النطقية أو النطقية السمعية و46.1% من الإعاقات العقلية أو العقلية والحركية، و29.8% من الإعاقات البصرية، و30.8% من الإعاقات السمعية هي إعاقات خلقية. بالمقابل 11.8% من الإعاقات ناتجة عن إصابات عمل.

أما بخصوص التدخين فقد بلغت نسبة المدخنين في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل (10 سنوات فصاعداً) 19.8% (35.6% بين الذكور و3.2% بين الإناث) بينما تصل نسبة المدخنين بين الأفراد 18 فصاعداً إلى 26.3% (47.9% بين الذكور و4.2% بين الإناث). وتشير النتائج إلى أن 0.3% من الفئة العمرية 10-14 سنة يدخنون.

ترتفع نسبة المدخنين تدريجياً مع ارتفاع الجيل، ففي مجموعة الجيل 15-17 سنة بلغت نسبة المدخنين 4.5% وبلغت 34.9% في مجموعة الجيل 45-55. كما ويظهر من النتائج أن حوالي 40% من مجمل المدخنين الفلسطينيين ضمن الفئات العمرية من 45 فصاعداً يدخنون أكثر من 20 سيجارة يومياً.

أما تدخين الأريغيلة فقد إنتشرت في السنوات الأخيرة كظاهرة في المجتمع الإسرائيلي عامة، وكذلك في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل. وإتضح من نتائج المسح أن 1.7% من الفلسطينيين في إسرائيل من 10 سنوات فصاعداً أفادوا أنهم يمارسون تدخين الأريغيلة، بواقع 1.8% في الشمال، و1.0% في منطقة الوسط مقابل 2.1% في منطقة الجنوب وكذلك بواقع 3.2% من الذكور مقابل 0.2% من الإناث. ويبرز في منطقة الجنوب ارتفاع تدخين الأريغيلة في الفئة العمرية 18-24 عاماً. وتبين المعطيات أن النسبة الأعلى (82.5%) من مدخني الأريغيلة هم من جيل 15 حتى 34 عاماً.

على مستوى آخر، أفاد 15.8% من السكان أنهم يحتاجوا لعلاج صحي / طبي خلال الأسبوعين الذين سبقوا المسح، ربعهم من الأطفال حتى سن 4 أعوام. كما ويظهر أن الذكور شكلوا 45.6% من مجمل الذين احتاجوا للعلاج مقابل 54.4% الإناث. وقد احتاج 25.6% للعلاج مرتين أو أكثر. ومن بين مجمل الذين تلقوا العلاج خلال أسبوعين قبل المسح 25.8% تلقوا العلاج من قبل طبيب أخصائي (مختص).

6.0% من الفلسطينيين في إسرائيل أفادوا بانهم مكثوا في المستشفى لتلقي العلاج خلال فترة الأشهر الستة التي سبقت المسح بواقع 5.9% من الذكور و6.1% من الإناث. وارتفعت هذه النسبة في منطقة الجنوب حيث أفاد 10.3% عن مبيت في المستشفى لتلقي العلاج. أما الأطفال حتى سن 4 فقد شكلوا 18.8% من مجمل المرضى الذين مكثوا في المستشفى خاصة في الجنوب حيث بلغت نسبة الاطفال 29.5%. من جهة أخرى، فقد ارتفعت

نسبة الإناث اللواتي إحتجن للمكوث في المستشفى في منطقة الجنوب الى 57.7% مقارنة بمنطقة الوسط 46.5% ومنطقة الشمال 47.9%.

كما أن 52.3% من السكان الفلسطينيين في إسرائيل أفادوا بأنهم مؤمنين تأميناً صحياً مكملاً وغالبيتهم ضمن صندوق المرضى المنتمين اليه. 1.9% من سكان الشمال مؤمنون تأميناً صحياً مكملاً بواسطة شركات خاصة مقارنة بـ 0.7% من سكان منطقة الوسط و 1.3% من منطقة الجنوب.

30.2% من السكان أفادوا بأنهم يمارسون الرياضة البدنية، من بينهم 13.4% يمارسون الرياضة بشكل مستمر، أما الرياضة الأكثر شيوعاً فهي المشي والتي يمارسها 19.4% من السكان، وخاصة النساء.

جدول 1.11: نسبة السكان الفلسطينيين في إسرائيل الذين أفادوا بأنهم مصابون بأمراض مزمنة ويتلقون علاجاً حسب فئات العمر ونوع المرض، 2004
 Table 11.1: Percentage of Palestinian Population in Israel Who Reported Certain Chronic Diseases and are Receiving Treatment by Age Group and Disease, 2004

Age Groups	عدد الأفراد سنة 2003 No. of Persons 2003	غير مصاب Healthy	Disease المرض										فئات العمر Age Groups		
			أخرى* Other	أمراض وراثية Hereditary Disease	ربو (أزمة) Asthma	قرحة Ulcer	سرطان Cancer	أمراض القلب Cardiac Disease	ضغط دم Blood Pressure	سكري Diabetes					
Both Sexes															
0-4	161,300	98.6	-	0.2	1.0	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	4-0	
5-9	127,799	97.9	0.0	0.2	1.6	-	0.1	0.1	-	-	-	-	0.2	9-5	
10-14	135,401	98.1	0.1	0.2	0.9	-	-	0.2	-	-	-	-	0.2	14-10	
15-19	98,600	98.6	0.1	0.4	0.7	0.0	-	0.1	-	-	-	-	0.1	19-15	
20-24	88,600	98.7	0.1	-	0.7	0.1	-	0.1	-	-	-	-	0.1	24-20	
25-29	87,200	98.4	-	0.5	0.5	0.2	-	0.1	-	-	0.1	-	0.2	29-25	
30-34	75,800	94.7	0.1	0.3	0.5	0.7	0.2	0.5	0.2	0.2	1.2	1.0	1.0	34-30	
35-39	56,610	90.0	0.4	0.6	2.0	2.2	0.1	1.3	0.1	0.1	2.4	2.5	2.5	39-35	
40-44	60,090	85.7	-	0.6	1.4	1.5	0.1	2.0	0.1	0.1	6.0	5.5	5.5	44-40	
45-49	37,703	79.5	0.2	0.4	2.2	1.1	0.9	4.1	0.9	0.9	9.0	8.7	8.7	49-45	
50-54	28,897	66.0	0.6	1.3	2.8	2.0	0.7	7.3	0.7	0.7	15.8	15.8	15.8	54-50	
55-59	22,911	57.3	0.6	1.4	3.4	2.4	2.1	9.0	2.1	2.1	20.0	21.0	21.0	59-50	
60-64	17,989	42.6	0.3	1.1	2.2	2.5	1.0	9.7	1.0	1.0	29.4	30.6	30.6	64-60	
65+	32,100	33.3	-	1.6	5.1	3.4	0.8	17.9	0.8	0.8	34.0	34.5	34.5	+65	
Total	1,031,000	91.4	0.1	0.4	1.3	0.6	0.2	1.6	0.2	0.2	3.4	3.4	3.4	المجموع	

*Other: Includes Epilepsy, Rheumatism, Anemia

*أخرى: تشمل صرع، أمراض المفاصل، فقر الدم.

جدول 3.11: نسبة السكان الفلسطينيين في إسرائيل الإناث الذين أفادوا بأنهم مصابون بأمراض مزمنة ويتلقون علاجاً حسب فئات العمر ونوع المرض، 2004
 Table 11.3: Percentage of Female Palestinian Population in Israel Who Reported Certain Chronic Diseases and are Receiving Treatment by Age Group and Disease, 2004

Age Groups	عدد الأفراد سنة 2003 No. of Persons 2003	غير مصاب Healthy	المرض Disease								فئات العمر		
			أخرى* Other	أمراض وراثية Hereditary Disease	ربو (أزمة) Asthma	قرحة Ulcer	سرطان Cancer	أمراض القلب Cardiac Disease	ضغط دم Blood Pressure	سكري Diabetes			
Females													
0-4	78,600	99.2	-	0.2	0.6	-	-	0.0	-	-	-	-	4-0
5-9	64,368	98.3	-	0.2	1.2	-	0.1	-	-	-	-	-	9-5
10-14	63,632	98.4	0.2	0.1	0.9	-	-	0.3	-	-	-	0.0	14-10
15-19	48,400	98.3	0.1	0.6	0.6	0.0	-	0.1	-	-	-	0.2	19-15
20-24	43,800	99.3	0.2	-	0.2	-	0.1	-	0.1	-	-	0.2	24-20
25-29	42,600	97.2	-	1.0	0.8	0.3	-	0.2	0.2	0.1	-	0.3	29-25
30-34	36,900	95.0	0.0	0.3	0.4	0.6	0.0	0.2	0.2	1.2	1.2	1.2	34-30
35-39	26,290	90.2	0.6	0.7	2.5	0.9	0.2	0.8	0.2	2.0	2.0	2.7	39-35
40-44	30,809	84.4	-	0.9	1.5	1.3	0.1	1.3	1.3	7.5	7.5	5.8	44-40
45-49	19,081	80.0	0.2	0.4	3.1	0.5	1.2	2.7	2.7	9.1	9.1	7.9	49-45
50-54	14,319	63.8	-	1.9	3.0	1.7	0.6	4.3	4.3	18.0	18.0	18.8	54-50
55-59	10,577	54.0	0.9	1.8	4.0	2.3	4.0	5.3	5.3	22.2	22.2	23.4	59-50
60-64	9,723	41.0	-	1.2	3.2	2.7	1.2	7.7	7.7	33.4	33.4	31.6	64-60
65+	17,100	27.1	-	2.7	3.8	3.7	1.2	18.0	18.0	41.4	41.4	38.1	+65
Total	506,200	90.9	0.1	0.5	1.2	0.5	0.2	1.3	1.3	4.0	4.0	3.8	الإناث

*Other: Includes Epilepsy, Rheumatism, Anemia

* آخرى: تشمل صرع، أمراض المفصل، فقر الدم.

جدول 4.11: نسبة السكان الفلسطينيين في إسرائيل الذين أفادوا بأنهم مصابون بأمراض مزمنة ويتلقون علاجاً حسب المنطقة، الجنس و نوع المرض، 2004
 Table 11.4: Percentage of Palestinian Population in Israel Who Reported Certain Chronic Diseases and are Receiving Treatment by Region, Sex and Disease, 2004

Region and Sex	عدد الأفراد سنة 2003 No. of Persons 2003	غير مصاب Healthy	Disease المرض										المنطقة والجنس		
			أخرى* Other	أمراض وراثية Hereditary Disease	ربو (أزمة) Asthma	قرحة Ulcer	سرطان Cancer	أمراض القلب Cardiac Disease	ضغط دم Blood Pressure	سكري Diabetes					
North															
Males	385,100	91.6	0.1	0.4	1.2	0.8	0.1	2.0	3.0	3.2		الشمال			
Females	373,100	90.5	0.1	0.6	1.1	0.5	0.2	1.4	4.3	4.0		ذكور			
Both Sexes	758,200	91.0	0.1	0.5	1.1	0.7	0.1	1.7	3.7	3.6		إناث			
Center															
Males	72,300	90.1	0.3	0.2	2.3	0.8	0.2	1.7	2.8	3.6		كلا الجنسين			
Females	67,700	89.6	0.3	0.4	1.8	0.6	0.5	1.6	4.3	5.2		الوسط			
Both Sexes	140,000	89.9	0.3	0.3	2.1	0.7	0.4	1.6	3.5	4.4		ذكور			
South															
Males	67,400	95.5	0.1	0.1	1.3	0.2	0.1	1.2	0.9	1.5		الجنوب			
Females	65,400	94.4	0.1	0.3	1.4	0.1	0.4	0.8	1.9	1.5		ذكور			
Both Sexes	132,800	95.0	0.1	0.2	1.4	0.1	0.2	1.0	1.4	1.5		إناث			
Total															
Males	524,800	91.9	0.1	0.3	1.4	0.7	0.1	1.9	2.7	3.0		المجموع			
Females	506,200	90.9	0.1	0.5	1.2	0.5	0.2	1.3	4.0	3.8		ذكور			
Both Sexes	1,031,000	91.4	0.1	0.4	1.3	0.6	0.2	1.6	3.4	3.4		إناث			

*Other: Includes Epilepsy, Rheumatism, Anemia

* أخرى: تشمل صرع، أمراض المفاصل، فقر الدم.

جدول 5.11: نسبة السكان الفلسطينيين في إسرائيل الذين أفادوا بانهم مصابون بأمراض مزمنة ويتلقون علاجاً حسب بعض الخصائص الخلفية ونوع المرض، 2004
Table 11.5: Percentage of Palestinian Population in Israel Who Reported Certain Chronic Diseases and are Receiving Treatment by Selected Background Characteristics and Disease, 2004

Background Characteristics	عدد الأفراد سنة 2003 No. of Persons 2003	غير مصاب Healthy	المرض								الخصائص الخلفية		
			أخرى* Other	أمراض وراثية Hereditary Disease	ربو (أزمة) Asthma	قرحة Ulcer	سرطان Cancer	أمراض القلب Cardiac Disease	ضغط دم Blood Pressure	سكري Diabetes			
Locality Classification													
Urban Community "A"	435,287	89.3	0.1	0.5	1.5	0.7	0.2	2.2	4.5	4.4	تجمع حضري "أ"		
Urban Community "B"	315,978	91.9	0.1	0.4	1.2	0.8	0.1	1.2	2.9	3.2	تجمع حضري "ب"		
Rural Community	98,548	92.6	0.2	0.4	0.6	0.5	0.2	1.3	2.8	3.1	تجمع قروي		
Bedouin Community	181,127	94.7	0.1	0.2	1.3	0.2	0.2	1.0	1.6	1.7	تجمع بدوي		
Locality Characteristics													
Mixed	74,704	87.3	0.4	0.5	3.2	1.0	0.4	2.0	4.0	4.4	طبيعة التجمع		
Unmixed	956,296	91.7	0.1	0.4	1.1	0.6	0.2	1.6	3.3	3.4	مختلط		
Displacement Status													
Displacement	155,938	90.2	0.3	0.7	1.9	1.2	0.2	1.8	3.7	3.5	مهاجر		
Placement	874,732	91.6	0.1	0.4	1.2	0.5	0.2	1.6	3.3	3.4	غير مهاجر		
Total	1,031,000	91.4	0.1	0.4	1.3	0.6	0.2	1.6	3.4	3.4	المجموع		

*Other: Includes Epilepsy, Rheumatism, Anemia
 *أخرى: تشمل صرع، أمراض الفصائل، فقر الدم.

جدول 6.11: نسبة السكان الفلسطينيين المعاقين في إسرائيل حسب نوع الإعاقة والفئة العمرية، 2004

Table 11.6: Percentage of Disabled Palestinian Population in Israel by Type of Disability and Age Group, 2004

Age Groups	عدد الأفراد سنة 2003 No. of Persons 2003	غير معاق Not Disabled	نوع الإعاقة Type of Disability								فئات العمر Age Groups
			استخدام الأصابع أو أخرى Grasping or Others	متعددة Multiple	حركية Physical	عقلية أو عقلية وحركية Mental or Mental & Physical	نطقية أو سمعية وناطقية Speech or Hearing & Speech	سمعية Hearing	بصرية Visual		
0-9	289,099	98.9	0.1	-	0.4	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	9-0
10-19	234,001	98.1	0.0	0.1	0.4	0.5	0.2	0.3	0.2	0.2	19-10
20-29	175,800	97.5	0.2	0.0	0.7	0.6	0.5	0.1	0.4	0.4	29-20
30-39	132,410	97.0	0.3	0.4	1.1	0.7	-	0.3	0.3	0.3	39-30
40-49	97,793	96.0	0.4	-	2.2	0.3	0.2	0.6	0.3	0.3	49-40
50-59	51,807	91.4	0.8	0.7	4.7	0.3	0.1	1.0	1.0	1.0	59-50
60+	50,089	88.4	0.3	0.1	5.8	0.3	0.1	2.4	2.6	2.6	+60
Total	1,031,000	97.1	0.2	0.1	1.2	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	المجموع

جدول 7.11: التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين المعاقين في إسرائيل حسب نوع الإعاقة وبعض الخصائص الخلفية، 2004
 Table 11.7: Percentage Distribution of Disabled Palestinian Population in Israel by Type of Disability and Selected Background Characteristics, 2004

Background	المجموع Total	Type of Disability نوع الإعاقة							الخصائص الخلفية
		استخدام الأصابع أو أخرى Grasping or Others	متعددة Multiple	حركية Physical	عقلية أو عقلية وحركية Mental or Mental & Physical	نطقية أو سمعية و لفظية Speech or Hearing & Speech	سمعية Hearing	بصرية Visual	
North	100.0	5.9	5.1	43.0	10.3	8.0	13.5	14.2	شمال
Center	100.0	10.9	2.2	31.2	27.8	5.5	13.4	9.1	وسط
South	100.0	4.9	2.1	39.0	15.9	15.7	11.0	11.2	جنوب
Sex									الجنس
Males	100.0	7.7	5.4	44.0	13.2	6.9	13.1	9.7	ذكور
Females	100.0	4.9	2.7	35.3	14.7	10.6	13.3	18.4	إناث
Locality Classification									نوع التجمع
Urban Community "A"	100.0	8.1	4.7	44.2	13.2	4.1	13.2	12.5	تجمع حضري "أ"
Urban Community "B"	100.0	5.4	4.8	35.0	12.2	14.7	13.5	14.4	تجمع حضري "ب"
Rural Community	100.0	2.1	3.1	41.2	20.7	4.7	15.5	12.7	تجمع قروي
Bedouin Community	100.0	6.0	2.8	37.4	14.8	14.7	11.3	13.1	تجمع بدوي
Total	100.0	6.6	4.3	40.6	13.8	8.4	13.2	13.1	المجموع

جدول 8.11: التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين المعاقين في إسرائيل حسب نوع الإعاقة وفئات العمر، 2004
 Table 11.8: Percentage Distribution of Disabled Palestinian Population in Israel by Type of Disability and Age Group, 2004

Age Groups	المجموع Total	نوع الإعاقة Type of Disability							فئات العمر
		استخدام الأصابع أو أخرى Graspings or Others	متعددة Multiple	حركية Physical	عقلية أو عقلية وحركية Mental or Physical &	نطقية أو سمعية ولفظية Speech or Hearing & Speech	سمعية Hearing	بصرية Visual	
0-9	100.0	9.4	-	34.8	12.6	28.3	8.1	6.8	9-0
10-19	100.0	2.4	7.1	22.7	25.9	10.8	18.3	12.9	19-10
20-29	100.0	6.5	1.0	26.3	24.2	20.4	5.4	16.2	29-20
30-39	100.0	8.4	12.6	36.1	24.9	-	9.3	8.8	39-30
40-49	100.0	10.3	-	56.2	6.3	4.1	15.6	7.6	49-40
50-59	100.0	9.2	8.6	54.8	4.0	0.9	11.3	11.2	59-50
60+	100.0	2.8	1.0	50.0	2.3	0.9	20.7	22.3	+60
Total	100.0	6.6	4.3	40.6	13.8	8.4	13.2	13.1	المجموع

جدول 9.11: التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين المعاقين في إسرائيل حسب سبب الإعاقة ونوعها، 2004

Table 11.9: Percentage Distribution of Disabled Palestinian Population in Israel by Cause and Type of Disability, 2004

Cause of Disability	المجموع Total	نوع الإعاقة Type of Disability							سبب الإعاقة
		استخدام الأصابع أو أخرى Grasping or Others	متعددة Multiple	حركية Physical	عقلية أو عقلية وحركية Mental or Mental & Physical	نطقية أو سمعية ونطقية Speech or Hearing & Speech	سمعية Hearing	بصرية Visual	
Disease	29.7	31.2	15.9	34.3	15.4	15.3	30.5	42.4	مريض
Congenital	30.8	17.5	53.9	18.1	46.1	67.6	30.8	29.8	خالق
Birth-Related	7.0	11.0	3.5	3.5	25.3	7.5	1.5	2.9	أثناء الولادة
War	0.9	0.5	5.1	0.1	-	-	1.0	3.3	حرب
Work Injury	11.8	13.0	12.3	18.0	2.7	-	18.6	1.8	أصابة عمل
Traffic Accident	4.6	-	4.2	9.0	1.1	4.9	0.8	0.9	حادث سير
Other Accidents	7.2	7.0	-	10.6	2.5	4.8	2.6	10.0	حوادث أخرى
Other	8.1	19.9	5.2	6.3	7.0	-	14.1	8.8	أخرى
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	المجموع

11-10

جدول 10.11 : التوزيع النسبي للفلسطينيين في إسرائيل حسب نوع التأمين الصحي المكمل وبعض الخصائص الخلفية، 2004

Table 11.10: Percentage Distribution of Palestinian Population in Israel by Type of Supplementary Health Insurance and Selected Background Characteristics, 2004

Background Characteristics	المجموع Total	بدون تأمين مكمل Without Supplementary Insurance	نوع التأمين الصحي المكمل Type of Supplementary Health Insurance			الخصائص الخلفية
			كوبت هوليم وشركة خاصة Kapat Holim & Private Company	شركة خاصة Private Company	كوبت هوليم Kapat Holim	
Region						المنطقة
North	100.0	43.8	2.1	1.9	52.3	شمال
Center	100.0	29.3	4.2	0.7	65.8	وسط
South	100.0	33.8	0.8	1.3	64.0	جنوب
Sex						الجنس
Males	100.0	40.5	2.4	1.9	55.1	ذكور
Females	100.0	40.5	1.9	1.4	56.1	إناث
Locality Classification						نوع التجمع
Urban Community "A"	100.0	37.7	2.6	2.3	57.4	تجمع حضري "أ"
Urban Community "B"	100.0	45.4	2.1	1.4	51.2	تجمع حضري "ب"
Rural Community	100.0	34.0	3.6	0.6	61.8	تجمع قروي
Bedouin Community	100.0	42.5	0.6	1.2	55.7	تجمع بدوي
Locality Characteristics						طبيعة التجمع
Mixed	100.0	27.1	2.1	0.6	70.2	مختلط
Unmixed	100.0	41.6	2.2	1.8	54.5	غير مختلط
Locality Type						تصنيف التجمع
Recognized	100.0	39.9	2.2	1.6	56.3	مُعترف
Unrecognized	100.0	51.6	2.0	2.9	43.5	غير مُعترف
Total	100.0	40.5	2.2	1.7	55.6	المجموع

جدول 11.11: التوزيع النسبي للفلسطينيين في إسرائيل (10 سنة فأكثر) (الذين يمارسون عادة التدخين حسب المنطقة وبعض الخصائص الخلفية، 2004)
 Table 11.11: Percentage Distribution of Palestinians in Israel (Aged 10 Years and Above) Who Smoke by Region and Selected Background Characteristics, 2004

Background Characteristics	جنوب South		وسط Center		شمال North		المجموع Total		الخصائص الخلفية
	غير مدخن Doesn't Smoke	مدخن Smokes	غير مدخن Doesn't Smoke	مدخن Smokes	غير مدخن Doesn't Smoke	مدخن Smokes	غير مدخن Doesn't Smoke	مدخن Smokes	
Age Groups									فئات العمر
10-14	100.0	-	99.7	0.3	99.6	0.4	99.7	0.3	14-10
15-17	94.1	5.9	96.8	3.2	95.5	4.5	95.5	4.5	17-15
18-24	81.3	18.7	76.3	23.7	82.5	17.5	81.6	18.4	24-18
25-34	72.8	27.2	68.9	31.1	74.8	25.2	73.8	26.2	34-25
35-44	76.9	23.1	63.9	36.1	68.9	31.1	68.8	31.2	44-35
45-54	79.2	20.8	61.2	38.8	64.6	35.4	65.1	34.9	54-45
55-64	67.6	32.4	68.7	31.3	73.7	26.3	72.6	27.4	64-55
65+	66.0	34.0	85.6	14.4	79.6	20.4	79.8	20.2	+65
Sex									الجنس
Males	70.5	29.5	60.1	39.9	64.3	35.7	64.4	35.6	ذكور
Females	98.9	1.1	95.9	4.1	96.6	3.4	96.8	3.2	إناث
Locality Classification									نوع التجمع
Urban Community "A"	-	-	76.4	23.6	78.7	21.3	78.1	21.9	تجمع حضري "أ"
Urban Community "B"	-	-	80.1	19.9	81.0	19.0	81.0	19.0	تجمع حضري "ب"
Rural Community	-	-	87.2	12.8	82.5	17.5	82.9	17.1	تجمع قروي
Bedouin Community	84.4	15.6	-	-	81.2	18.8	83.4	16.6	تجمع بدوي
Total	84.4	15.6	77.1	22.9	80.2	19.8	80.2	19.8	المجموع

جدول 11.11 تابع: التوزيع النسبي للفلسطينيين في إسرائيل (10 سنوات فاكثر) الذين يمارسون عادة التدخين حسب المنطقة وبعض الخصائص الخلفية، 2004

Table 11.11 cont.: Percentage Distribution of Palestinians in Israel (Aged 10 Years and Above) Who Smoke by Region and Selected Background Characteristics, 2004

Background Characteristics	جنوب		وسط		شمال		المجموع		الخصائص الخلفية
	غير مدخن Doesn't Smoke	مدخن Smokes	غير مدخن Doesn't Smoke	مدخن Smokes	غير مدخن Doesn't Smoke	مدخن Smokes	غير مدخن Doesn't Smoke	مدخن Smokes	
Educational Attainment									
Illiterate	81.9	18.1	82.3	17.7	85.7	14.3	84.3	15.7	أمي
Knowledgeable	95.1	4.9	87.6	12.4	89.1	10.9	90.0	10.0	ملم
Elementary	90.1	9.9	78.5	21.5	83.1	16.9	83.2	16.8	ابتدائي
Preparatory	77.9	22.1	74.6	25.4	78.8	21.2	78.1	21.9	اعدادي
Secondary	76.9	23.1	72.0	28.0	76.7	23.3	76.1	23.9	ثانوي
College Degree	78.9	21.1	77.3	22.7	79.9	20.1	79.5	20.5	شهادة كلية
First Degree and Above	92.1	7.9	80.1	19.9	74.5	25.5	75.8	24.2	لقب أول فأعلى
Total	84.4	15.6	77.1	22.9	80.2	19.8	80.2	19.8	المجموع

جدول 12.11 : التوزيع النسبي للفلسطينيين في إسرائيل (10 سنوات فأكثر) الذين يمارسون عادة التدخين حسب المنطقة، فئات العمر وفترة التدخين، 2004

Table 11.12: Percentage Distribution of Palestinians in Israel (Aged 10 Years and Above) Who Smoke by Region, Age Group and Smoking Period, 2004

Region and Age Groups	Number of Smoking Years □□□□□□□ □□□□□ □□□							المنطقة وفئات العمر
	المجموع Total	غير مبين Not Stated	11+	6-10	3-5	1-2	أقل من سنة Less than 1	
Age Group								فئات العمر
Less than 17	100.0	3.6	-	-	13.1	65.6	17.6	أقل من 17
18-24	100.0	1.2	0.4	13.6	45.8	35.4	3.7	24-18
25-34	100.0	0.6	30.6	35.3	27.0	5.8	0.7	34-25
35-44	100.0	0.5	78.5	13.4	4.3	2.4	0.9	44-35
45-54	100.0	0.5	89.1	6.0	2.2	1.7	0.5	54-45
55-64	100.0	0.3	94.1	4.6	1.1	-	-	64-55
65+	100.0	2.0	92.4	4.8	0.8	-	-	+65
Region								المنطقة
North	100.0	0.8	54.7	16.8	17.3	9.1	1.3	شمال
Center	100.0	0.3	56.1	19.2	13.6	9.5	1.4	وسط
South	100.0	1.0	42.6	18.1	20.1	14.9	3.3	جنوب
Total	100.0	0.8	53.9	17.3	17.0	9.6	1.5	المجموع

11-13

جدول 13.11: التوزيع النسبي للفلسطينيين في إسرائيل (10 سنوات فأكثر) الذين يدخنون السجائر حسب فئات العمر وعدد السجائر التي يدخنونها يوميا، 2004

Table 11.13: Percentage Distribution of Palestinians in Israel (Aged 10 Years and Above) Who Smoke Cigarettes by Age Group and Number of Smoked Cigarettes Daily, 2004

Age Groups	المجموع Total	عدد السجائر المدخنة Number of Smoked Cigarettes				فئات العمر كلا الجنسين
		أكثر من 40 More than 40	21-40	11-20	10 فأقل and Below 10	
Both Sexes						
Less than 17	100.0	0.0	13.5	51.7	34.9	17 □□ □□□
18-24	100.0	0.5	20.7	58.0	20.8	24-18
25-34	100.0	3.7	27.6	51.9	16.8	34-25
35-44	100.0	6.9	31.0	48.6	13.5	44-35
45-54	100.0	9.7	33.5	42.8	14.0	54-45
55-64	100.0	12.7	35.0	35.4	16.9	64-55
65+	100.0	12.2	24.0	50.1	13.8	+65
Total	100.0	6.3	28.8	48.8	16.1	المجموع

جدول 14.11: التوزيع النسبي للفلسطينيين في إسرائيل (10 سنوات فاكثر) الذين يمارسون عادة تدخين الارجيلة حسب المنطقة وبعض الخصائص الخلفية، 2004

Table 11.14: Percentage Distribution of Palestinians in Israel (Aged 10 Years and Above) Who Smoke Nargila by Region and Selected Background Characteristics, 2004

Background Characteristics	South جنوب		Center وسط		North شمال		Total المجموع		الخصائص الخلفية
	لا يدخن الارجيلة	يدخن الارجيلة	لا يدخن الارجيلة	يدخن الارجيلة	لا يدخن الارجيلة	يدخن الارجيلة	لا يدخن الارجيلة	يدخن الارجيلة	
Age Groups									فئات العمر
Less than 17	99.0	1.0	100.0	-	99.7	0.3	99.7	0.3	أقل من 17
18-24	94.1	5.9	97.4	2.6	96.5	3.5	96.3	3.7	24-18
25-34	98.5	1.5	98.0	2.0	96.4	3.6	96.8	3.2	34-25
35-44	98.8	1.2	99.6	0.4	98.4	1.6	98.6	1.4	44-35
45-54	98.4	1.6	99.5	0.5	99.5	0.5	99.4	0.6	54-45
55-64	100.0	-	100.0	-	99.6	0.4	99.7	0.3	64-55
65+	100.0	-	100.0	-	99.8	0.2	99.8	0.2	+65
Sex									الجنس
Males	95.8	4.2	98.3	1.7	96.6	3.4	96.8	3.2	ذكور
Females	100.0	-	99.9	0.1	99.8	0.2	99.8	0.2	إناث
Locality Classification									نوع التجمع
Urban Community "A"	-	-	99.0	1.0	98.0	2.0	98.3	1.7	تجمع حضري "أ"
Urban Community "B"	-	-	99.0	1.0	97.9	2.1	98.0	2.0	تجمع حضري "ب"
Rural Community	-	-	100.0	-	98.9	1.1	99.0	1.0	تجمع قروي
Bedouin Community	97.9	2.1	-	-	99.7	0.3	98.4	1.6	تجمع بدوي
Total	97.9	2.1	99.0	1.0	98.2	1.8	98.3	1.7	المجموع

11-15

جدول: 15.11 التوزيع النسبي للفلسطينيين (10 سنوات فأكثر) في إسرائيل الذين يدخنون الارغيلة حسب المنطقة، فئات العمر والجنس، 2004

Table 11.15: Percentage Distribution of Palestinians in Israel (Aged 10 Years and Above) Who Smoke Nargila by Region, Sex and Age Group, 2004

Age Groups and Sex	جنوب South	وسط Center	شمال North	المجموع Total	فئات العمر و الجنس
Age Groups					فئات العمر
10-14	-	:	-	-	14-10
15-17	17.2	:	3.9	5.3	17-15
18-24	57.2	:	33.0	37.0	24-18
25-34	15.5	:	43.9	40.2	34-25
3-544	6.0	:	15.0	13.1	44-35
45-54	4.0	:	2.5	2.9	54-45
55-64	-	:	1.3	1.0	64-55
65+	-	:	0.5	0.4	+65
Total	100.0	:	100.0	100.0	المجموع
Sex					الجنس
Males	100.0	:	94.8	95.4	ذكور
Females	-	:	5.2	4.6	إناث
Both Sexes	100.0	:	100.0	100.0	كلا الجنسين

جدول 16.11: التوزيع النسبي للفلسطينيين في إسرائيل (10 سنوات فأكثر) الذين تركوا عادة التدخين حسب المنطقة وبعض الخصائص الخلفية، 2004

Table 11.16: Percentage Distribution of Palestinians in Israel (Aged 10 Years and Above) Who Quit Smoking by Region and Selected Background Characteristics, 2004

Background Characteristics	Region المنطقة			المجموع Total	الخصائص الخلفية
	جنوب South	وسط Center	شمال North		
Sex					الجنس
Males	98.3	83.8	87.0	87.2	ذكور
Females	1.7	16.2	13.0	12.8	إناث
Both Sexes	100.0	100.0	100.0	100.0	كلا الجنسين
Locality Classification					نوع التجمع
Urban Community "A"	-	95.6	45.7	50.1	تجمع حضري "أ"
Urban Community "B"	-	1.3	41.1	33.4	تجمع حضري "ب"
Rural Community	-	3.1	11.1	9.4	تجمع قروي
Bedouin Community	100.0	-	2.0	7.1	تجمع بدوي
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	المجموع
Months of Quitting Smoking					عدد أشهر ترك التدخين
Less than 6	1.9	7.7	13.0	11.7	أقل من 6
6-12	22.7	17.1	13.7	14.6	6-12
13-24	17.1	10.0	6.3	7.4	13-24
25-48	19.4	19.0	10.9	12.5	25-48
49+	38.9	46.1	56.2	53.8	49+
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	المجموع

11-17

جدول 17.11: نسبة الفلسطينيين في إسرائيل الذين دخلوا المستشفى (مبيت) في الأشهر الستة السابقة للمسح حسب المنطقة وبعض الخصائص الخلفية، 2004

Table 11.17: Percentage of Palestinians in Israel Who were Hospitalized during the Six Months prior to the Survey by Region and Selected Background Characteristics, 2004

Background Characteristics	Region المنطقة			المجموع Total	الخصائص الخلفية
	جنوب South	وسط Center	شمال North		
Age Groups					فئات العمر
0-4	12.7	8.0	5.5	7.2	0-4
5-14	5.1	1.8	2.3	2.7	5-14
15-29	12.2	6.1	4.0	5.3	15-29
30-39	12.6	6.8	5.8	6.5	30-39
40-49	11.4	5.8	6.6	6.8	40-49
50+	19.5	17.9	12.0	13.3	+50
Total	10.3	6.6	5.2	6.0	المجموع
Sex					الجنس
Males	8.6	6.9	5.3	5.9	ذكور
Females	12.1	6.4	5.0	6.1	إناث
Locality Classification					نوع التجمع
Urban Community "A"	-	6.5	5.5	5.8	تجمع حضري "أ"
Urban Community "B"	-	8.2	5.5	5.6	تجمع حضري "ب"
Rural Community	-	7.6	3.4	3.7	تجمع قروي
Bedouin Community	10.3	-	4.2	8.7	تجمع بدوي
Total	10.3	6.6	5.2	6.0	المجموع

جدول 18.11: التوزيع النسبي للفلسطينيين في إسرائيل الذين دخلوا المستشفى (مبيت) في الأشهر الستة السابقة للمسح حسب المنطقة وبعض الخصائص الخلفية، 2004

Table 11.18: Percentage Distribution of Palestinians in Israel Who were Hospitalized during the Six Months prior to the Survey by Region and Selected Background Characteristics, 2004

Background Characteristics	Region المنطقة			المجموع Total	الخصائص الخلفية
	جنوب South	وسط Center	شمال North		
Age Groups					فئات العمر
0-4	29.5	19.2	14.9	18.8	0-4
5-14	16.0	6.7	10.9	11.4	5-14
15-29	30.1	24.0	21.0	23.4	15-29
30-39	10.8	14.0	15.0	13.9	30-39
40-49	4.9	7.9	13.4	10.7	40-49
50+	8.7	28.3	24.9	21.8	50+
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	المجموع
Sex					الجنس
Males	42.3	53.5	52.1	50.2	ذكور
Females	57.7	46.5	47.9	49.8	إناث
Both Sexes	100.0	100.0	100.0	100.0	كلا الجنسين
Locality Classification					نوع التجمع
Urban Community "A"	-	86.8	43.5	40.3	تجمع حضري "أ"
Urban Community "B"	-	7.3	43.4	28.4	تجمع حضري "ب"
Rural Community	-	5.9	8.0	5.9	تجمع قروي
Bedouin Community	100.0	-	5.2	25.3	تجمع بدوي
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	المجموع
Times of Hospitalization					عدد مرات دخول المستشفى (مبيت)
1	85.2	77.9	75.8	78.2	1
2-3	14.1	16.6	21.5	19.1	3-2
4-6	0.6	4.2	2.0	2.0	6-4
7-10	-	0.4	0.2	0.2	10-7
11+	0.1	1.0	0.5	0.5	+11
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	المجموع

11-19

جدول 19.11: التوزيع النسبي للفلسطينيين في إسرائيل لآخر مرة دخلوا المستشفى (مبيت) في الأشهر الستة السابقة للمسح حسب المنطقة وبعض الخصائص الخلفية، 2004

Table 11.19: Percentage Distribution of Palestinians in Israel Last Hospitalized during the Six Months prior to the Survey by Region and Selected Background Characteristics, 2004

Background Characteristics	Region المنطقة			المجموع Total	الخصائص الخلفية
	جنوب South	وسط Center	شمال North		
Hospital Place					موقع المستشفى
In the same Town of Residence	0.1	8.6	12.3	9.1	في نفس البلدة التي أسكن فيها
In Other Town 20 km away	30.0	72.5	44.1	45.2	في بلدة أخرى تبعد حتى 20 كم
In Other Town 21-40 km away	64.6	14.9	33.1	37.3	في بلدة أخرى تبعد 21-40 كم
In Other Town more than 40 km away	5.2	4.0	10.5	8.4	في بلدة أخرى تبعد أكثر من 40 كم
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	المجموع
Health Needs					الحاجة الصحية
Chronic Disease	8.8	15.0	8.5	9.5	مرض مزمن
Routine Check-up	8.1	1.6	5.6	5.6	مراجعة عادية
Physical Health Problem	23.1	21.7	36.2	31.1	مشكلة صحية عضوية
Urgent Case	20.4	28.1	25.1	24.5	حالة طارئة
Psychological Case	0.3	-	0.2	0.2	مشكلة نفسية
Injury\Accident	17.2	7.0	6.3	8.8	إصابة / جرح
Child Immunization	0.3	-	0.0	0.1	تطعيم أطفال
Antenatal Care	14.5	6.8	8.0	9.2	رعاية حوامل
More than one Health Problem	2.1	3.8	1.8	2.1	أكثر من مشكلة صحية
Other	5.2	16.0	8.3	8.8	أخرى
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	المجموع
Number of Days					عدد أيام المبيت
1-7	86.4	85.0	85.0	85.3	7-1
8-15	12.1	10.5	9.4	10.2	15-8
16-30	1.3	2.8	3.7	3.1	30-16
31-60	-	0.8	1.3	0.9	60-31
More than 60	0.1	0.9	0.6	0.5	أكثر من 60
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	المجموع

جدول 20.11: التوزيع النسبي للفلسطينيين في إسرائيل لأخر مرة دخلوا المستشفى (مبيت) خلال الأشهر الستة السابقة للمسح حسب موقع المستشفى وعدد أيام المبيت والحاجة الصحية، 2004

Table 11.20: Percentage Distribution of Palestinians in Israel Last Hospitalized during the Six Months prior to the Survey by Hospital Location, Number of Days and Health Needs, 2004

Background Characteristics	المجموع Total	Health Needs										الخصائص الخلفية
		أخرى Others	أكثر من مشكلة صحية More than one Problem	رعاية حوامل Antenatal Care	إصابة/ جرح Injury \ Accident	حالة طارئة Urgent Case	مشكلة صحية عضوية Physical Health Problem	مراجعة عادية Routine Check up	مرض مزمن Chronic Disease			
Hospital Location												
In the same Town of Residence	9.1	7.3	10.4	7.2	3.9	7.0	11.5	11.3	12.8		موقع المستشفى	
In Other Town 20 km away	45.2	52.6	35.0	54.2	42.7	44.4	45.5	26.0	45.9		في نفس البلدة التي أسكن فيها	
In Other Town 21-40 km away	37.3	31.4	36.5	29.9	48.9	40.8	36.2	50.7	27.2		في بلدة أخرى تبعد حتى 20 كم	
In Other Town more than 40 km away	8.4	8.7	18.0	8.7	4.5	7.8	6.8	12.0	14.1		في بلدة أخرى تبعد أكثر من 40 كم	
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	المجموع	
Number of Days											عدد أيام المبيت	
1-7	85.3	88.5	78.3	95.3	82.0	84.6	84.5	98.3	75.4		7-1	
8-15	10.2	7.2	5.7	3.9	12.0	9.6	12.1	-	18.1		15-8	
16-30	3.1	1.8	13.2	-	6.0	3.6	2.2	1.7	4.5		30-16	
31-60	0.9	-	-	0.8	-	1.5	1.2	-	1.3		60-31	
More than 60	0.5	2.4	2.8	-	-	0.7	-	-	0.8		أكثر من 60	
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	المجموع	

Other: Includes Psychological Case , Child Immunization*

* أخرى: تشمل مشكلة نفسية، تطعيم أطفال

11-21

جدول 21.11: نسبة الفلسطينيين في إسرائيل الذين احتاجوا تلقي خدمات صحية خلال الأسبوعين السابقين للمسح حسب تلقي الخدمة وبعض الخصائص الخلفية، 2004

Table 11.21: Percentage of Palestinians in Israel Who Needed Health Services during the Two Weeks prior to the Survey by Received Service and Selected Background Characteristics, 2004

Background Characteristics	المجموع Total	لم يتلقى الخدمة Didn't Receive Health Services	تلقي الخدمة Received Health Services	الخصائص الخلفية
Age Groups				فئات العمر
0-4	100.0	74.8	25.2	4-0
5-14	100.0	88.9	11.1	14-5
15-29	100.0	90.5	9.5	29-15
30-39	100.0	87.0	13.0	39-30
40-49	100.0	82.5	17.5	49-40
50+	100.0	68.1	31.9	+50
Sex				الجنس
Males	100.0	85.9	14.1	ذكور
Females	100.0	82.5	17.5	إناث
Locality Classification				نوع التجمع
Urban Community "A"	100.0	84.2	15.8	تجمع حضري "أ"
Urban Community "B"	100.0	85.4	14.6	تجمع حضري "ب"
Rural Community	100.0	87.7	12.3	تجمع قروي
Bedouin Community	100.0	80.5	19.5	تجمع بدوي
Region				المنطقة
North	100.0	86.1	13.9	شمال
Center	100.0	80.9	19.1	وسط
South	100.0	77.2	22.8	جنوب
Total	100.0	84.2	15.8	المجموع

جدول 22.11 : التوزيع النسبي للفلسطينيين في إسرائيل الذين احتاجوا تلقي خدمات صحية خلال الأسبوعين السابقين للمسح حسب المنطقة وبعض الخصائص الخلفية، 2004

Table 11.22: Percentage Distribution of Palestinians in Israel Who Needed Health Services during the Two Weeks prior to the Survey by Region and Selected Background Characteristics, 2004

Background Characteristics	Region المنطقة			المجموع Total	الخصائص الخلفية
	جنوب South	وسط Center	شمال North		
Age Groups					فئات العمر
0-4	36.2	22.7	22.4	25.0	4-0
5-14	21.7	19.6	16.4	17.9	14-5
15-29	19.8	18.2	14.3	16.0	29-15
30-39	7.5	10.1	11.5	10.5	39-30
40-49	4.8	9.7	12.4	10.5	49-40
50+	9.9	19.8	22.9	20.0	+50
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	المجموع
Sex					الجنس
Males	47.7	44.2	45.4	45.6	ذكور
Females	52.3	55.8	54.6	54.4	إناث
Both Sexes	100.0	100.0	100.0	100.0	كلا الجنسين
Locality Classification					نوع التجمع
Large Community "A"	.	91.4	42.0	42.3	تجمع حضري "أ"
Medium Community "B"	.	4.1	42.8	28.5	تجمع حضري "ب"
Small Community	.	4.5	10.3	7.4	تجمع قروي
Bedouin Community	100.0	.	4.9	21.8	تجمع بدوي
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	المجموع
Times of Receipt of Health Services					عدد مرات تلقي الخدمة الصحية
1	76.6	69.4	75.1	74.4	1
2	20.0	21.6	15.9	17.6	2
3	2.4	3.3	4.3	3.7	3
4	0.5	2.2	2.4	2.0	4
5+	0.5	3.5	2.4	2.2	+5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	المجموع

11-23

جدول 23.11: التوزيع النسبي للأفراد الفلسطينيين في إسرائيل الذين احتاجوا تلقي خدمات صحية خلال

الأسبوعين السابقين للمسح حسب المنطقة، مكان تلقي الخدمة ومقدم الخدمة الصحية، 2004

Table 11.23: Percentage Distribution of Palestinians in Israel Who Needed Health Services during the Two Weeks prior to the Survey by Region, Place of Receipt of Service and Personnel Providing the Service, 2004

Place of Receipt of Health Service and Personnel Providing Service	Region المنطقة			المجموع Total	مكان تلقي الخدمة ومقدم الخدمة
	جنوب South	وسط Center	شمال North		
Place of Receipt of Health Service					مكان تلقي الخدمة الصحية
Kupat Holim	73.7	83.3	81.7	80.5	صندوق المرضى
Private Clinic	9.9	11.2	11.5	11.1	عيادة خاصة
Hospital Emergency Room	5.0	1.9	1.6	2.3	عيادة طوارئ في المستشفى
Clinic in the Hospital	7.6	2.8	3.5	4.1	عيادة أخرى في المستشفى
Other	3.7	0.7	1.7	1.9	أخرى
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	المجموع
Personnel Providing the Service					مقدم الخدمة الصحية
Physician	58.1	65.2	68.5	66.0	طبيب عام
Specialist	29.5	27.4	24.3	25.8	طبيب اخصائي
Nurse	11.9	6.6	4.4	6.2	ممرض / ممرضة
Health Worker	0.5	–	1.2	0.8	عامل / ة صحية
Pharmacist	–	0.8	0.9	0.7	صيدلي
Others	–	–	0.8	0.5	آخرون
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	المجموع

جدول 24.11: التوزيع النسبي للأفراد الفلسطينيين في إسرائيل الذين احتاجوا تلقي خدمات صحية خلال الأسبوعين السابقين للمسح حسب مكان تلقي الخدمة ومقدم الخدمة الصحية، 2004

Table 11.24: Percentage Distribution of Palestinians in Israel Who Needed Health Services during the Two Weeks prior to the Survey by Place of Receipt of Service and Personnel Providing the Service, 2004

Place of Receipt of Health Service	الاجموع Total	مقدم الخدمة الصحية Providing the Service						مكان تلقي الخدمة Place of Receipt
		آخرون Others	صيدلي Pharmacist	عامل/ة صحية Health Worker	مررض/ة Nurse	طبيب اخصائي Specialist	طبيب عام Physician	
Place of Receipt of Health Services								
Kupat Holim	100.0	0.5	0.6	0.8	4.9	16.4	76.8	صندوق المرضى
Private Clinic	100.0	1.0	0.5	-	3.4	68.7	26.4	عيادة خاصة
Hospital Emergency Room	100.0	-	-	-	9.7	46.4	43.9	عيادة طوارئ في المستشفى
Clinic in the Hospital	100.0	-	-	-	11.3	83.8	4.9	عيادة أخرى في المستشفى
Other	100.0	-	7.2	11.4	60.5	18.4	2.5	أخرى
Total	100.0	0.5	0.7	0.8	6.2	25.8	66.0	الاجموع

11-25

جدول 25.11: التوزيع النسبي للنساء الفلسطينيات المتزوجات أو اللواتي سبق وتزوجن في إسرائيل (17-54 سنة) حسب القرابة مع الزوج وبعض الخصائص الخلفية، 2004

Table 11.25: Percentage Distribution of Palestinian Women in Israel (Aged 17-54 Years) Who Have Ever Been Married by Relation to Husband and Selected Background Characteristics, 2004

Selected Background Characteristics	Type of Household نوع الأسرة				بعض الخصائص الخلفية
	المجموع Total	لا توجد علاقة قرابة No Relation	قريب من نفس الحمولة Other Relative	قرابة درجة أولى Relation of First Degree	
Region					المنطقة
North	100.0	62.2	16.3	21.5	شمال
Center	100.0	75.0	9.9	15.1	وسط
South	100.0	35.7	26.9	37.4	جنوب
Total	100.0	61.2	16.5	22.3	المجموع
Religion and Age Groups					الديانة والفئات العمرية
Total					المجموع الكلي
Less than 20	100.0	44.8	27.3	28.0	أقل من 20
20-29	100.0	60.9	18.2	20.9	29-20
30-39	100.0	62.3	15.3	22.5	39-30
40-49	100.0	59.8	17.4	22.8	49-40
50+	100.0	64.6	12.3	23.1	+50
Total	100.0	61.2	16.5	22.3	المجموع
Muslim					مسلم
Less than 20	100.0	44.8	27.3	28.0	20 □□ □□□
20-29	100.0	59.1	19.3	21.7	29-20
30-39	100.0	59.6	17.1	23.3	39-30
40-49	100.0	57.9	18.6	23.6	49-40
50+	100.0	65.1	13.3	21.6	+50
Total	100.0	59.3	17.9	22.8	المجموع

جدول 25.11 تابع: التوزيع النسبي للنساء الفلسطينيات المتزوجات أو اللواتي سبق وتزوجن في إسرائيل (17-54 سنة) حسب القرابة مع الزوج وبعض الخصائص الخلفية، 2004
 Table 11.25 cont.: Percentage Distribution of Palestinian Women in Israel (Aged 17-54 Years) Who Have Ever Been Married by Relation to Husband and Selected Background Characteristics, 2004

Selected Background Characteristics	Type of Household نوع الأسرة				بعض الخصائص الخلفية
	المجموع Total	لا توجد علاقة No Relation	قريب من نفس الحمولة Other Relative	قرابة درجة أولى Relation of First Degree	
Christian					مسيحي
Less than 20	-	-	-	-	20 □□ □□□
20-29	100.0	68.0	14.0	18.0	29-20
30-39	100.0	94.6	1.1	4.2	39-30
40-49	100.0	78.0	10.3	11.7	49-40
50+	100.0	77.1	2.5	20.4	+50
Total	100.0	81.4	7.2	11.4	المجموع
Druze					درزي
Less than 20	-	-	-	-	20 □□ □□□
20-29	100.0	74.7	10.1	15.2	29-20
30-39	100.0	55.0	12.0	33.0	39-30
40-49	100.0	52.5	16.9	30.6	49-40
50+	100.0	48.3	14.4	37.3	+50
Total	100.0	58.0	13.5	28.5	المجموع

11-26

جدول 26.11: نسبة الأفراد الفلسطينيين في إسرائيل (10 سنوات فأكثر) الذين يمارسون الرياضة المختلفة حسب نوع الرياضة وبعض الخصائص الخلفية، 2004

Table 11.26: Percentage of Palestinian Persons in Israel (10 Years and Above) Who Practice Different Sports by Type of Sport and Selected Background Characteristics, 2004

Background Characteristics	Type of Sport نوع الرياضة							Sport رياضة			الخصائص الخلفية
	أخرى Other	كرة سلة Basket Ball	كرة قدم Foot Ball	رقص Dan-cing	سباحة Swimming	مشي Walking	ركض Running	لا No	أحيانا Sometimes	بشكل مستمر Always	
Total	4.8	3.5	10.3	3.7	7.7	19.4	11.5	69.8	16.8	13.4	المجموع
Region											المنطقة
North	4.8	3.7	9.5	4.0	8.5	20.2	11.4	70.2	17.0	12.8	شمال
Center	6.4	3.1	7.7	2.7	6.9	16.3	10.4	67.9	15.5	16.6	وسط
South	2.7	1.9	20.0	2.9	2.6	17.3	14.0	69.9	16.7	13.4	جنوب
Sex											الجنس
Males	5.7	4.9	20.8	0.6	11.6	18.9	15.1	64.0	17.4	18.6	ذكور
Females	4.0	2.2	0.9	6.5	4.1	19.8	8.3	75.1	16.1	8.7	إناث
Age Groups											فئات العمر
10-19	9.2	13.2	32.1	6.0	16.2	27.3	29.6	44.1	29.0	26.9	19-10
20-29	4.6	1.2	8.5	5.5	6.8	20.4	10.8	69.0	17.5	13.5	29-20
30-39	5.1	1.5	5.3	3.2	7.2	19.0	8.0	73.6	15.1	11.3	39-30
40-49	2.4	1.1	3.6	1.6	5.9	17.0	6.0	79.7	12.3	8.0	49-40
50+	1.2	0.2	0.2	0.7	1.2	11.3	1.1	87.8	7.4	4.8	50+
Qualification											المؤهل العلمي
None	3.5	3.7	11.6	1.3	4.9	11.4	10.5	79.0	10.9	10.1	لا شيء
Elementary	4.7	5.0	12.5	2.9	9.2	17.2	12.6	70.6	17.4	12.0	ابتدائي
Preparatory	5.1	4.4	12.1	3.5	6.1	15.8	10.9	71.7	16.7	11.5	اعدادي
Secondary	4.2	2.1	8.3	4.4	7.5	21.2	11.3	69.4	16.1	14.5	ثانوي
College and Above	6.8	2.6	7.2	6.2	11.1	31.4	12.0	58.2	22.7	19.1	شهادة كلية فأعلى
Labor Force											العلاقة بقوى العمل
Employment	5.3	2.1	9.1	3.1	10.0	21.5	10.7	68.0	17.6	14.4	العمالة
Unemployment	3.9	2.1	12.6	3.8	5.8	23.9	10.2	67.3	15.8	17.0	البطالة
Outside Labor Force	3.0	2.1	4.8	3.8	3.6	15.3	7.1	78.6	13.0	8.4	خارج قوى العمل
Main Reason of Practicing Sport											السبب الأساسي لممارسة الرياضة
Keeping Healthy	30.6	17.0	18.2	27.3	30.4	42.9	29.6	-	38.8	33.4	الحفاظ على الصحة
Keeping Slim	25.8	11.8	7.5	43.7	17.9	27.6	20.2	-	25.5	18.3	الحفاظ على الرشاقة
Hobby	37.1	59.3	69.5	24.3	47.6	25.0	43.5	-	30.8	43.8	هواية
Other	6.5	11.9	4.8	4.7	4.2	4.5	6.8	-	4.9	4.5	أخرى

and physical disabilities, 29.8% visual disabilities, and 30.8% hearing disabilities, compared to disabilities caused by work accidents, which account for 11.8% of the total disabilities.

The rate of Palestinian smokers in Israel (aged 10 years and above) is 19.8% (35.6% of males and 3.2% of females). The rate of smokers age 18 years and above is 26.3% (47.9% among males and 4.2% among females). The findings indicate that 0.3% of the 10-14 age group are smokers. The rate of smokers increases with age; in the 15-17 age group, the rate of smoking is 4.5%, and increases to 34.9% in the 45-55 age group. The data indicate that approximately 40% of Palestinian smokers aged 45 years and above smoke more than 20 cigarettes per day.

In recent years the trend in smoking "nargila" (a water pipe) has increased in Israeli society in general, as well as in the Palestinian community in particular. The survey indicated that 1.7% of Palestinians in Israel aged 10 and above smoke nargila, distributed as 3.2% of males and 0.2% of females. With regard to geographic distribution, the rate is 1.8% in the North, 1.0% in the Center, and 2.1% in the South. It is noteworthy that the incidence of smoking nargila is highest in the South among the 18-24 age group, and that 82.5% of nargila smokers are in the 15-34 age group.

15.8% of respondents reported that they had needed some health or medical care during the two-week period prior to the survey, a quarter of whom were children aged 4 years and under. Of these, 45.6% were males and 54.4% were females. 25.6% needed treatment twice or more. Of those who needed treatment in the two weeks prior to the survey, 25.8% received treatment from a specialist.

In the six-month period prior to the survey, 6.0% of respondents reported needing hospitalization (5.9% of males and 6.1% of females). The highest rate of those needing hospitalization was found in the South (10.3%). 18.8% of patients needing hospitalization were children aged 4 years and under. In the South this rate increases to 29.5%. The rate of females needing hospitalization is higher in the South (57.7%) compared to the North (47.9%) and the Center (46.5%).

52.3% of Palestinians in Israel indicated that they have supplementary health insurance, mostly through their membership of "National Health Sick Funds" (Kupat Holim). 1.9% of Palestinians in the North have supplementary health insurance through private companies, compared to 0.7% in the Center and 1.3% in the South.

Around 30.2% of Palestinians in Israel exercise and 13.4% always exercise. The most common sport is walking, recorded at a rate of 19.4% among the Palestinian community, and particularly females.

Health

8.6% of Palestinians in Israel suffer from chronic diseases, distributed as 9.1% of females and 8.1% of males. With regard to geographic distribution, the rate is 9.0% in the North, 10.1% in the Center, and 5.0% in the South. It is noteworthy that the highest rate is found in the mixed cities (12.7%).

3.4% of Palestinians in Israel suffer from diabetes. The rate of this disease is higher among females (3.8%) compared to males (3.0%). With regard to geographic distribution, the rate is 3.6% in the North, 4.4% in the Center and 1.5% in the South. There is a correlative increase in the incidence of diabetes from age 30 and above among both sexes.

3.4% of the Palestinian community indicated that they suffer from high blood pressure: 3.7% in the North, 3.5% in the Center, and 1.4% in the South. This rate is more common among females (4.0%) compared to males (2.7%). This gap in the incidence of the disease between the sexes is particularly evident in the 50 years-and-above age group.

1.6% of respondents indicated that they suffer from heart disease; this rate is higher among males in all geographic areas (1.9% compared to 1.3% of females). The lowest rate of heart disease is found among females in the South, where it is 0.8%. The findings also indicate that the incidence of heart disease in the 35-64 age group is twice as high among males than among females.

0.2% indicated they suffer from a type of cancer; this rate is higher among females, (0.2%) than among males (0.1%). It is interesting to note that there is a sharp increase in the incidence of cancer among females in the 45-49 age group (1.2%), but that the highest incidence rate is found among females in the 55-59 age group (4.0%). The incidence rate of cancer is twice as high in the Center compared to the North and South.

0.6% of Palestinians in Israel indicated they suffer from a stomach ulcer. The rate is the lowest in the South (0.1%) compared to the other areas (the North and the Center).

1.3% indicated that they suffer from asthma. This rate increases in the Center (2.1% compared to 1.1% in the North and 1.4% in the South).

2.9% of Palestinians in Israel are disabled and a high percentage (8.6%) is found in the 50-59 age group. Of the disabilities reported, 40.6% are physical disabilities, which affect 1.2% of the population. 13.2% of the reported disabilities are hearing disabilities, 13.1% are visual.

With regard to the cause of disability, 30.8% are congenital (from birth), of which 67.6% are speech disabilities and/or speech and hearing disabilities, 46.1% mental disabilities and/or mental

Chapter Eleven

Health

